

# KUMPEL




Region Süd-Deutschland



## Lässt Dich nicht im Stich

- ✓ Hohes Ertragspotential
- ✓ Kurz und standfest
- ✓ Hohe Bestockungsleistung
- ✓ Ausgezeichnetes Resistenzprofil mit zusätzlicher Resistenz gegen Halmbruch
- ✓ Hohe und stabile Fallzahlen
- ✓ Gute Winterhärte



Quelle: BSA, Beschreibende Sortenliste 2025. Im Vergleich zu den fünf vermehrungsstärksten A-Winterweizen in Deutschland.



**Nadine Schreiber**  
Regionalberaterin Südwest-D  
+49 151 67990140  
nadine.schreiber@secobra.de



**Martin Mayer**  
Regionalberater Südost-D  
+49 160 9905 5428  
martin.mayer@secobra.de



**Justin Pfündner**  
Regionalberater Mittel-D  
+49 151 4079 6710  
justin.pfuendner@secobra.de

# KUMPEL

Region Süd-Deutschland

## Wichtig

- ✓ Nicht zu dick drillen
- ✓ Wachstumsregler leicht unter Durchschnitt

### Zentralhess. Ackerbaugeb.

Saatmenge  
Früh ca. 210 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 250 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 320 Kö/m<sup>2</sup>



#### Höhenlagen

Saatmenge  
Früh ca. 230 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 280 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 340 Kö/m<sup>2</sup>

#### Mittelgebirgs- lagen /Fränkische Platten

Saatmenge  
Früh ca. 230 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 280 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 360 Kö/m<sup>2</sup>

#### V- Standorte

Saatmenge  
Früh ca. 250 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 290 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 390 Kö/m<sup>2</sup>

Wachstumsregler  
**Fränkische Platten**  
T1 - I/ha CCC\*  
T2 0,2 I/ha Moddus\*

#### V-Standorte

T1 -  
T2 0,2 I/ha Moddus\*

#### Jura/Hügelland

T1 -  
T2 0,25 I/ha Moddus\*

#### Gäu/Tertiärhügelland

T1 -  
T2 0,3 I/ha Moddus\*

#### Voralpen/Schwarzw.

T1 -  
T2 0,25 I/ha Moddus\*

#### Rheingraben/Wärme.

T1 -  
T2 0,25 I/ha Moddus\*

#### Mittellagen RLP/SA

T1 -  
T2 0,2 I/ha Moddus\*

#### Höhenlagen RLP/SA

T1 -  
T2 0,2 I/ha Moddus\*

#### Zentralh.Ackerbaug.

T1 -  
T2 0,2 I/ha Moddus\*

#### Mittellagen

Saatmenge  
Früh ca. 210 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 250 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 300 Kö/m<sup>2</sup>

Saatmenge  
Früh ca. 240 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 270 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 320 Kö/m<sup>2</sup>

Saatmenge  
Früh ca. 230 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 260 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 320 Kö/m<sup>2</sup>

#### Rheingraben / Wärmelagen

Saatmenge  
Früh ca. 200 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 220 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 290 Kö/m<sup>2</sup>

#### Voralpen / Schwarzwald

Saatmenge  
Früh ca. 250 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittel ca. 300 Kö/m<sup>2</sup>  
Spät ca. 380 Kö/m<sup>2</sup>

## Offizielle Einstufungen KUMPEL

|               |   |               |   |                 |   |               |   |               |   |
|---------------|---|---------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Ährenschieben | 6 | Lager         | 3 | DTR             | 4 | Kornzahl/Ähre | 7 | Fallzahl      | 8 |
| Reife         | 5 | Pseudocerc.   | 3 | Gelbrost        | 2 | TKM           | 4 | Fallzahlstab. | + |
| Pflanzenlänge | 4 | Mehltau       | 2 | Braunrost       | 3 | Kornertrag 1  | 7 | Protein       | 3 |
| Auswinterung  | - | Blattseptoria | 3 | Ährenfusarium   | 4 | Kornertrag 2  | 7 | Sedi-wert     | 5 |
|               |   |               |   | Bestandesdichte | 5 | HLG           | 5 | N-Effizienz   | 6 |

